Uso de fármacos modificadores de la enfermedad

La Junta Nacional de Asesores Clínicos de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple recomienda que se considere comenzar el tratamiento con el uso de uno de los medicamentos derivados del interferón beta o el acetato de glatimer, luego del diagnóstico definitivo de esclerosis múltiple de tipo recurrente. También recomienda que se considere su uso en las personas que presentan una primera exacerbación y tienen un gran riesgo de desarrollar EM.

Poniendo los puntos claros

Los fármacos modificadores de la enfermedad:

- **no** curan la esclerosis múltiple.
- **no** están diseñados para sentirse mejor,
- **no** previene los síntomas recurrentes, tales como la fatiga o el adormecimiento

Para muchos individuos, los fármacos modificadores de la enfermedad:

- **Sí ayudan** a reducir el número de exacerbaciones,
- **Sí ayudan** a reducir la acumulación de lesiones en el sistema nervioso central
- **Sí retrasan** la acumulación de discapacidad

Los fármacos modificadores de la enfermedad se deben considerar como una inversión para el futuro.

La decisión de usar una de estas drogas se debe hacer considerando cuidadosamente los siguientes factores:

- ✓ el estilo de vida del individuo,
- ✓ los efectos secundarios,
- ✓ el riesgo potencial y
- ✓ el beneficio de cada una de las terapias.

La mejor manera de elegir uno de estos tratamientos es tener una conversación detallada con su médico. Cada persona puede responder de diferente manera a estos fármacos. (Vea el folleto: "Fármacos que Modifican la Enfermedad")

Tome Control de su Esclerosis Múltiple fue posible gracias a una generosa subvención de la Fundación Medtronic.